


FORMAZIONE E CADUTA DEI PALCHI NEI CERVIDI

PROCESSO RELATIVO AL CAPRIOLO



NOTA:

LA CONCENTRAZIONE EMATICA DI TESTOSTERONE AUMENTA DA GENNAIO - FEBBRAIO FINO A RAGGIUNGERE IL PICCO MASSIMO A LUGLIO - AGOSTO. QUI CESSA LA PRODUZIONE DI GONADOTROPINA. DOPO AGOSTO LA PRESENZA DEL TESTOSTERONE NEL FLUSSO EMATICO SI RIDUCE RAPIDAMENTE DI PARI PASSO ALLA RAPIDA RIDUZIONE DI PESO E VOLUME DEI TESTICOLI CHE RITORNANO PROGRESSIVAMENTE AI MINIMI VALORI PONDERALI. DA OTTOBRE I LIVELLI DI TESTOSTERONE CIRCOLANTE TORNANO A VALORI MOLTO BASSI E QUASI INDOSABILI. DA OTTOBRE A DICEMBRE PARTICOLARI CELLULE (OSTEOCLASTI) ERODONO LA BASE DELLE STANGHE SUBITO AL DI SOTTO DELLA ROSA, PROVOCANDONE LA CADUTA L'UNA DOPO L'ALTRA CON UN INTERVELLO DI ORE O AL MASSIMO DI QUALCHE GIORNO. NEL CONTEMPO LA SOMATOTROPINA, NON PIU' ANTAGONIZZATA DAL TESTOSTERONE, NEL GIRO DI QUALCHE SETTIMANA DARA' ORIGINE ALLA COSTRUZIONE DEL PALCO SUCCESSIVO.